

# 猴痘

## 一、概述

- (一)1958 年猴痘病毒(Mpox virus)首次從研究用猴子身上被發現，因此該病被命名為「猴痘」。
- (二)隨著 1980 年天花消滅和之後停止接種天花疫苗，猴痘成為現存最嚴重的正痘病毒感染症。

## 二、症狀

- (一)發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處)、極度倦怠。
- (二)發燒一至三天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。
- (三)症狀持續 2-4 週，大多數個案可於幾週內康復。
- (四)兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

## 三、傳染途徑

### (一)人傳人：

#### 1. 密切接觸

經由親密接觸之性行為、與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等。

#### 2. 飛沫傳染

接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。

#### 3. 母子垂直傳染

產婦若感染猴痘病毒，可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染。

### (二)人畜共通傳染：

直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

## 四、治療照護

以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。


國際旅行請注意

# 猴痘是什麼？

猴痘（MPOX）是一種人畜共通傳染疾病。在流行地區以外，已出現人與人間持續傳播。



## 常見症狀



## 傳染方式



與感染者親密接觸，或  
直接接觸到病患的呼吸  
道分泌物、損傷的皮膚或  
黏膜，或被污染之物品



直接接觸感染動物



飛沫傳播

## 國際疫情

目前多國出現猴痘疫情，含  
歐洲、美洲等國家。



旅客有疑似症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC



[www.cdc.gov.tw](http://www.cdc.gov.tw)



1922防疫達人  
[www.facebook.com/TWCDC](https://www.facebook.com/TWCDC)



Taiwan CDC  
LINE@

# 猴痘

M P O X

## 您需要知道的事

### 猴痘疫情在許多國家是進行式

- 我國自2022/6/23列猴痘為第二類法定傳染病
- 猴痘是**可以預防**的，潛伏期約為3-21天，大多數人約2-4週會痊癒，少數人(如孕婦、幼童、長者、嚴重免疫不全者等)感染後發生重症的可能性高
- 確診後可能造成**身體極度不適或疼痛**
- 雖然猴痘可以影響任何人，傳播途徑包括人傳人(親密接觸或飛沫傳播)或動物傳人，但此波疫情**主要傳播途徑為人傳人、親密接觸為主**，且多數病例為男性

### 常見症狀

- 臉部、四肢、生殖器出現**不同型態的皮膚病灶**
- 發燒、頭痛、精神不濟
- **淋巴結腫大**(頸部、腋窩、腹股溝等處)
- 肌肉及背部痠痛
- 直腸出現疼痛腫脹
- 小便時疼痛或排尿困難



### 猴痘傳播途徑

- 人傳人：
  - 密切接觸病患的皮膚病灶處
  - 與病患發生親密**接觸之性行為**(口交、肛交或陰道交)
  - 接觸病患生殖器(陰莖、睪丸、陰唇及陰道)或肛門
  - 與病患進行擁抱、親吻或按摩
  - 接觸到病患呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品(包含衣服、床上用品、毛巾等個人物品)
  - **飛沫傳播**：需在長時間面對面接觸情境下較容易發生
  - **母子垂直感染**：可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染
- 人畜共通傳染：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染或食用受感染的動物肉類

### 如何保護自己預防感染

- 若您符合猴痘疫苗接種對象，**請接種疫苗**
- **避免與不特定對象發生親密行為**
- 隨時隨地**注意自身狀況**並檢查是否出現疑似症狀
- 如出現疑似症狀，務必佩戴口罩儘速就醫，並告訴醫師**疑似猴痘接觸史、高風險場域的暴露**
- 保持良好**手部衛生**(勤洗手、勿摸眼口鼻)
- 如家中有猴痘病患，請做好**居家環境清潔及消毒**
- 若前往流行地區，避免與野生動物接觸和生食肉類



### 猴痘疫苗

- 屬活性減毒非複製型疫苗，由於不會在哺乳類細胞內複製，可視為非活性疫苗，**安全性相對高**
- 我國建議接種對象包含：
  - ① 與確診猴痘個案曾性接觸之高風險接觸者
  - ② 正痘病毒屬之實驗室操作人員
  - ③ 近6個月內曾有高風險性行為者(性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)
  - ④ 照顧猴痘確診個案之醫護或清潔人員、協助採檢人員或執行疫苗接種作業人員
- 接種第1劑猴痘疫苗**14天後**保護力才能達到4-8成，所以在**14天內**仍要留意避免風險行為
- 與第1劑間隔28天以上，**完成第2劑疫苗接種**，則可趨近於**9成保護力**
- 接種後的副作用包括注射部位疼痛、發紅、腫脹、全身肌肉痠痛等



任何人都可能感染或傳播猴痘，我們共同的敵人是病毒，  
只要齊心協力做好預防工作，我們就能一起遏止疫情



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人  
www.facebook.com/TW-CDC

疫情通報及諮詢專線：1922

參考WHO之素材



# 注意 猴痘

## 你該這樣做




國內已有本土猴痘案例，民眾若前往流行地區或國內高風險場域，應避免與不特定人士親密接觸。




如有任何疑似症狀，請佩戴口罩並立即就醫告知旅遊史、高風險場域暴露史與接觸史。

### + 症狀好發部位



### + 猴痘症狀

出現不同型態的皮膚病灶，如：皮疹、水泡、膿疱



### + 可能伴隨症狀



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC



[www.cdc.gov.tw](http://www.cdc.gov.tw)



1922防疫達人

[www.facebook.com/TWCDC](https://www.facebook.com/TWCDC)



Taiwan CDC  
LINE@

廣告